

Mere zaštite od virusa Zapadnog Nila



Mera lične zaštite od uboda komaraca i njihovo uništavanje glavni su načini za smanjenje rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.



U saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" navodi se da je u toku sezone, svake godine od juna do novembra, kontinuirano se prati aktuelna epidemiološka situacija u vezi sa infekcijom virusom Zapadnog Nila, o čemu se javnost redovno obaveštava. Glavna mera zaštite je uništavanje komaraca.

„Batut“ je preporučio i mere lične prevencije virusa, poput upotrebe repelenata, nošenje komotne odeće dugih rukava i nogavica, izbegavanje boravka na otvorenom u vreme najintenzivnije aktivnosti komaraca, odnosno u sumrak i u zoru.



Pored toga, preporučuju i upotrebu zaštitnih mreža protiv komaraca na prozorima i vratima, boravak u klimatizovanim prostorima, izbegavanje šuma i močvara i isušivanje izvora stajaće vode.

Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Uklonite odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu – navodi se u saopštenju.